

Borboleta-Coruja: presa ou predador?

Categories : [Fauna e Flora](#)

Borboleta-coruja é o nome popular das borboletas pertencentes ao gênero *Caligo*. Na mitologia greco-romana, *Caligo* era a personificação das trevas, o que torna esse nome apropriado para descrever um gênero de borboletas de hábitos crepusculares: permanecem pousadas em troncos durante o dia e voam de manhã ou nas últimas horas do dia, antes do anoitecer.

São borboletas típicas de florestas úmidas e florestas secundárias do México, América Central e do Sul. Em geral, são muito grandes, um dos maiores exemplares de borboletas que se tem notícia, chegando a medir até 18 centímetros de envergadura. Em geral as fêmeas são maiores e menos coloridas que os machos.

Há cerca de 20 espécies deste gênero, que podem ser divididos em seis grupos que constituem "subgêneros": ***Caligo eurilochus*** (que inclui *C. bellerophon*, *C. brasiliensis*, *C. eurilochus*, *C. idomeneus*, *C. illioneus*, *C. memnon*, *C. prometheus*, *C. suzanna*, *C. telamonius*, *C. teucer*); ***Caligo arisbe*** (*C. arisbe*, *C. martia*, *C. oberthuri*); ***Caligo atreus*** (*C. atreus*, *C. uranus*); ***Caligo oileus*** (*C. oedipus*, *C. oileus*, *C. placidianus*, *C. zeuxippus*); ***Caligo beltrao*** (*C. beltrao*) as ***incertae sedis*** (*Caligo euphorbus*, *Caligo superbus*), cuja colocação é incerta em relação aos demais grupos.

Como a maioria das borboletas, são efêmeras: vivem aproximadamente por três meses. Mas até chegar à metamorfose completa, levam cerca de 105 dias. E como uma impressão digital: nenhum exemplar apresenta um padrão de asas exatamente igual ao outro.

Os machos tem um comportamento territorialista e, na época da cópula, perseguem as fêmeas incansavelmente. Após a cópula, a fêmea põe cerca de 50 ovos. A taxa de sobrevivência das lagartas após a eclosão dos ovos sofre em razão do grande número de predadores e parasitas como, por exemplo, as vespas da família Trichogrammatidae cujas larvas parasitam a borboleta e seus ovos.

O padrão das asas, origem do apelido borboleta-coruja, pelo lado de dentro, é um desenho semelhante ao rosto de uma coruja, com destaque para os olhos enormes e abertos. Um mistério científico: especula-se que o padrão de olho seja uma forma de [mimetismo](#), que confunde seus predadores. Muitos animais pequenos, que caçam principalmente usando o sentido da visão, hesitam em se aproximar da borboleta, "imaginando" estar diante de um dos seus predadores naturais. Este mecanismo anti-predação protege o animal enquanto descansa, se alimenta e acasala.

As espécies mais comuns no Brasil são a *Caligo beltrao* e a *Caligo eurilochs brasiliensis*, mais comuns no leste do país. Também são encontradas aqui a *Caligo martia*, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e a *Caligo memnon*, na Floresta Amazônica.

Leia Também

[Mutum-do-Nordeste: Haverá esperança?](#)

[Tubarão-baleia: só tem tamanho](#)

[Socó-jararaca: nome peculiar para uma ave peculiar](#)