

# Um novo calango baiano e seus parentes paraguaios

Categories : [Notícias](#)

Manaus, AM -- Uma nova espécie de lagarto foi descoberta no sertão nordestino, por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. O *Tropidurus sertanejo* foi coletado em duas localidades dos municípios da Caatinga baiana de Caetité e Ibotirama. A descrição foi publicada no jornal científico *Novitates*, do Museu Americano de História Natural.

O *T. sertanejo* pode chegar a oito centímetros de comprimento. Ele tem a cabeça bronzeada e o corpo marrom com pequenos pontos salmão. De acordo com a descrição, possui ainda uma combinação de dobras na pele em algumas regiões do corpo, conhecidas como “bolsas de ácaros”, onde se concentram larvas do parasita. O nome da espécie é uma homenagem aos habitantes do sertão nordestino.

Na mesma data, o líder do estudo, o biólogo André Luiz de Carvalho, do Museu Americano de História Natural, publicou a descrição de outras três espécies do mesmo gênero, encontradas no Paraguai. As espécies foram batizadas de *T. lagunablanca*, *T. tarara* (encontrada em uma região perto da fronteira com o Brasil) e *T. teyumirim*. “Até o início da década de 80 eram conhecidas apenas sete espécies de *Tropidurus*. Com a descrição de *Tropidurus sertanejo*, o número total de espécies chega a 26”, explica o pesquisador.

As descobertas são resultado de um esforço de pesquisa, que envolve viagens para coletas na América do Sul e visitas a coleções de museus, em diversos países. O estudo pretende estimar o número de espécies existentes no grupo e a distribuição de todas as espécies do grupo no continente sulamericano, além da diversidade e complexidade morfológica.

“Durante o meu doutorado analisamos dados genéticos e morfológicos de diversas populações desses lagartos ao longo de toda a América do Sul. Os resultados do projeto sugerem que ainda existem diversas espécies não descritas no grupo”, comenta André Luiz de Carvalho.

Mas ainda se sabe muito pouco sobre a distribuição geográfica, hábitos e interação com outras espécies do lagarto baiano. E os pesquisadores alertam também para a necessidade de tratar com atenção especial a preservação do *T. sertanejo*. Apenas uma das localidades em que foi registrado é protegida por lei, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Pé da Serra, com pouco menos de 13 km quadrados.

**Saiba Mais**

Artigo: [A new \*Tropidurus\* \(\*Tropiduridae\*\) from the semiarid Brazilian Caatinga: evidence for conflicting signal between mitochondrial and nuclear loci affecting the phylogenetic reconstruction of South American collared lizards](#)

**Leia Também**

<http://www.oeco.org.br/reportagens/25084-o-desafio-de-preservar-e-recuperar-a-caatinga/>

<http://www.oeco.org.br/noticias/24739-nova-especie-descoberta-na-caatinga/>

<http://www.oeco.org.br/reportagens/1358-oeco14291/>